

השפעת התפרצות נגיף COVID-19 על צריכת שירותי הרפואה הראשונית בקהילה ועל התוצאים הרפואיים בשירותי רפואה מרחוק מול טיפול במרפאה

ד"ר אילן גרין | ד"ר יבגני מרזון | ד"ר אביבית גולן-כהן | ד"ר אריאל ישראל | פרופ' שלמה וינקר | לאומית שירותי בריאות

הרקע המדעי

בעקבות התפרצות מגפת הקורונה (COVID-19), משק הבריאות נדרש לפתרונות שיאפשרו המשך טיפול רפואי תוך צמצום חשיפת המטופלים והמטפלים להדבקה. בעקבות זאת, השימוש במפגשים רפואיים מקוונים התרחב.

מטרות המחקר


להעריך את השפעת התפרצות הקורונה על מאפייני המפגשים הראשוניים בקהילה.

השיטה ותוכנית הביצוע


מחקר תצפיתי רטרוספקטיבי, על כלל מבוטחי לאומית. נבדקו נתונים לפני התפרצות המגפה, במהלך המגפה ובתקופה שלאחר שיא המגפה. על מנת לצמצם הטיות הקשורות לעונתיות, נדגמו תקופות מקבילות בשנים עוקבות.

התוצאות


משכי הביקור הממוצעים




ביקורים - רפואה ראשונית



ערך HBA1C הממוצע למטופל סוכרתי



התפלגות השימושים לפי קבוצת גיל 2021



המסקנות

- ✓ כמות הביקורים המקוונים עלתה בצורה דרמטית.
- ✓ הביקורים היוו תחליף לביקורים פרונטליים.
- ✓ נראה כי הגיל לא מהווה מגבלה בשימוש באמצעים דיגטליים.
- ✓ הקלות בה מבוצע ביקור מקוון, הביאה להיצע שמייצר ביקוש.
- ✓ חולי סוכרת שהשתמשו יותר בשירות מקוון היו מבוגרים יותר, חולים יותר, צורכים יותר שירותי רפואה - ובכל זאת, מחלתם מאוזנת טוב יותר.